

- (1) أ- تكشف عن الإستجابة الأرجية (أو الحساسية المفرطة الفورية).
ب - تعرف بالصدمة اللاوقائية.
(2) IgE هي العناصر المطلوبة.
(3) بعد دخول AG إلى جسم الكوبياي خلال الحقن الأول، تقوم البلعميات الكبيرة بعرض محددات مستضادية من AG. مما يؤدي إلى تنشيط T_4 التي تنشط بدورها لمفاويات B نوعية، التي تتحول إلى بلزميات مفرزة لـ IgE.
(4) أ - خلية عمادية (أو بدينة).
ب - تحتوي على الهيستامين (أو وسيط أرجي)
(5) أ - تطابق خلية الشكل (أ) المرحلة الأولى (أو المرحلة قبل الحقن الثاني).
التعليل : تثبت IgE على غشاء الخلية وظهور الحبيبات.
ب - تطابق خلية الشكل (ب). المرحلة الثانية (أو المرحلة بعد الحقن الثاني).
- التعليل : تثبت AG على IgE وتفرغ محتوى الحبيبات (6) آلية الإستجابة المناعية المؤدية إلى ظهور الأعراض الملاحظة عند C_1 بعد الحقن الثاني.
• حقن الكوبياي C_1 بمولد المضاد AG للمرة الأولى :
تحسيس للمفاويات B بإفراز هذه الأخيرة لمضادات أجسام ضد AG (IgE) : مرحلة التحسيس تثبت (IgE) على مستقبلات (IgE) المتواجدة بسطح الخلايا العمادية والمحتوية على حويصلات الهيستامين.
• دخول ثاني لنفس المؤرخ (AG).
* تنشيط العماديات : إزالة تحبب العماديات وإفراغ خارجي للهيستامين $\Leftarrow$ إستجابة فورية : إلتهاب الأنسجة المحلية وظهور أعراض أرجية $\Leftarrow$ إستجابة متأخرة : تؤدي إلى إستمرار النوبة الأرجية وإرتفاع شدتها $\Leftarrow$ إختناق وموت الكوبياي.

إعداد الأستاذ : عبد الله الرحموني