


موضوع البكالوريا في الميكانيك لدورة يونيو 2007 / 2008

موضوع شعبة العلوم التجريبية: الإمتحان الوطني



التمرين 1 (5,5 نقط)

نهمل جميع الاحتكاكات و نأخذ $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1- نعتبر قرصا متجانسا (D)، شعاعه $r = 10 \text{ cm}$ قابلا للدوران حول محور أفقي ثابت (Δ) منطبق مع محور تماثله. نلف حول القرص خيطا، غير قابل للامتداد، كتلته مهملة ولا ينزلق على القرص، ونثبت بطرفه الحر جسما صلبا (S) كتلته $m = 0,5 \text{ kg}$.

الجسم (S) قابل للانزلاق على سطح مائل بالزاوية $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للمستوى الأفقي (شكل 1). نطبق، بواسطة محرك، على القرص (D) مزدوجة محرك عزمها M ثابت، فينطلق مركز القصور G للجسم

(S) بدون سرعة من الموضع O لينتقل وفق المحور $(O, \vec{i})$ بتسارع ثابت $a = 2 \text{ m.s}^{-2}$.

1.1- حدد طبيعة حركة كل من الجسم (S) والقرص (D).

1.2- اكتب المعادلة الزمنية $x(t)$ لحركة G باسناد الموضع O أصلا للأفاصل واللحظة التي تأخذ فيها سرعة (S) القيمة 1 m.s^{-1} أصلا للتواريخ.

1.3- احسب عند اللحظة $t = 0,5 \text{ s}$ التسارع المماسي a_T والتسارع المنظمي a_N لنقطة من محيط القرص.

1.4- أوجد قيمة العزم M للمزدوجة محركية.

عزم قصور القرص بالنسبة للمحور (Δ) هو $J_\Delta = 9 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$.

2- نأخذ القرص (D) ونثبت في مركزه I سلك لي رأسي، كتلته مهملة وثابتة ليه C فنحصل على متذبذب (شكل 2).

ندير القرص (D) بزاوية θ_m ، انطلاقا من موضع التوازن ($\theta = 0$) حيث السلك غير ملتو، ثم نحرر القرص بدون سرعة بدئية، فينجز حركة تذبذبية حول محور رأسي (Δ') منطبق مع محور السلك. عزم قصور القرص بالنسبة للمحور (Δ') هو $J_{\Delta'} = 9 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$.



نعتبر موضع التوازن حالة مرجعية لطاقة وضع اللي ($E_p = 0$).

2.1- اعتمادا على الدراسة الطاقية، أثبت المعادلة التفاضلية لحركة القرص (D).

2.2- يمثل منحنى الشكل 3 تغيرات التسارع الزاوي $\ddot{\theta}$ للقرص بدلالة الأفاصول الزاوي θ .

أوجد، اعتمادا على المبيان، قيمة كل من الوسع θ_m والنض الخاص ω_0 لحركة المتذبذب واستنتج قيمة ثابتة اللي C.

2.3- احسب الطاقة الميكانيكية للمتذبذب. نأخذ $\pi^2 = 10$.



التصحيح

الفيزياء

التمرين 1

(1) 1-1: حركة الجسم S مستقيمة متغيرة بانتظام متسارعة نحو الأعلى. وحركة القرص دورانية متغيرة بانتظام.

1-2: المعادلة الزمنية لحركة G تكتب كما يلي :

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$$


من خلال المعطيات لدينا : الجسم ينطلق بدون سرعة من $\square$ اصل

مع : $a = 2m/s^2$ و $v_0 = 1m/s$

المعلم $v_0 = 0$

بتطبيق العلاقة المستقلة عن الزمن بين $\square$ والنقطة المطابقة لاصل التواريخ .

$$v_0^2 = 2ax_0 \Leftrightarrow v_0^2 - v_{\square}^2 = 2a(x_0 - x_{\square})$$



$$x_0 = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{1}{2 \times 2} = 0,25m$$

$$x = t^2 + t + 0,25$$

إذن:

$$v = 2t + 1$$

1-3: من خلال دالة السرعة : $v = at + v_0$ التي نكتب كما يلي :

$$\frac{dv}{dt} = 2$$

لدينا :

$$a_T = \frac{dv}{dt} = 2m/s^2$$

إذن: التسارع المماسي:

$$v = 2 \times 0,5 + 1 = 2m/s$$

وفي اللحظة $t = 0,5s$ تكون قيمة السرعة :


$$a_N = \frac{v^2}{r} = \frac{2^2}{0,1} = 40m/s^2$$

إذن التسارع المظمي :

1-4: بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك على كل من البكرة والجسم S لدينا :

$$\sum M_{\Delta} \vec{F} = J_{\Delta} \ddot{\theta}$$

بالنسبة للبكرة :



$$M_{\Delta} \vec{P} + M_{\Delta} \vec{R} + M_{\Delta} \vec{T} + M = J_{\Delta} \ddot{\theta}$$

لأن العزم محرك

$$O + O - Tr + M = J_{\Delta} \ddot{\theta}$$

$$(1) \quad M = J_{\Delta} \cdot \frac{a}{r} + Tr$$

ومنه:

وبالنسبة للجسم S لدينا $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T}' = m \cdot \vec{a}_G$$

بالإسقاط على ox :

$$-P \cdot \sin \alpha + o + T' = m \cdot a$$

الخيط غير قابل للمد $T' = T$

ومنه

$$T = m(g \cdot \sin \alpha + a) = 0,5 \times (10 \times 0,5 + 2) = 3,5N$$

وبالتعويض في العلاقة (1) لدينا :

$$M = J_{\Delta} \cdot \frac{a}{r} + Tr = 9 \times 10^{-2} \times \frac{2}{0,1} + 3,5 \times 0,1 = 0,53N.m$$

(2) 2-1:

$$E_M = \frac{1}{2} c \cdot \theta^2 + \frac{1}{2} J_{\Delta} \cdot \dot{\theta}^2 = Cte \quad \text{أي} \quad E_M = Ec + Ep$$

$$J_{\Delta} \ddot{\theta} + C\theta = 0$$

$$\text{ومنه} \quad \frac{dE_M}{dt} = \frac{1}{2} c \times 2\theta\dot{\theta} + \frac{1}{2} J_{\Delta} \times 2\dot{\theta}\ddot{\theta} = 0$$

أي: $\ddot{\theta} + \frac{C}{J_{\Delta}} \theta = 0$ المعادلة التفاضلية للحركة ونبضها الخاص: $\omega_0^2 = \frac{C}{J_{\Delta}}$
وأخيرا المعادلة التفاضلية تصبح:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$


2-2: مبيانيا لدينا: $\theta_m = \frac{\pi}{6}$
والمنحنى الممثل لتغيرات $\ddot{\theta}$ بدلالة θ عبارة عن دالة خطية معاملها الموجه
 $k = \frac{\Delta \ddot{\theta}}{\Delta \theta} = \frac{21 - 0}{-\frac{\pi}{6} - 0} = -\frac{21 \times 6}{\pi} \approx -40$
إذن معادلته: $\ddot{\theta} = -40\theta$ (a)
ومن خلال المعادلة التفاضلية السابقة لدينا: $\ddot{\theta} = -\omega_0^2 \theta$ (b)
من خلال (a) و (b): $\omega_0^2 = 40$ وبالتالي:
النابض الخاص: $\omega_0 = \sqrt{40} \approx 6,33 \text{ rad/s}$
وثابتة اللي: $C = J_{\Delta} \omega_0^2 = 9 \times 10^{-3} \times 40 = 0,36 \text{ N.m/rad}$

2-3: الطاقة الميكانيكية للمتذبذب: $E_M = \frac{1}{2} c \theta_m^2 = 0,5 \times 0,36 \times \frac{\pi^2}{36} = 0,5 \times 0,36 \times \frac{10}{36} = 0,05 \text{ J}$

موضوع الامتحان الوطني في الميكانيك لدورة يونيو علوم رياضية 2007

التمرين 1- (5.5 نقط)

- نهمل جميع الاحتكاكات و نأخذ $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ و $\pi^2 = 10$.
نعتبر المجموعة (S) الممثلة في الشكل - 1 و التي تتكون من:
- بكرة متجانسة شعاعها $r = 5 \text{ cm}$ ملتصمة بساق طولها $MN = 2L = 40 \text{ cm}$ يتطابق مركز قصورها مع المركز G للبكرة. المجموعة "الساق + البكرة" قابلة للدوران في المستوى الرأسي حول محور أفقي (Δ) ثابت يمر من المركز G . عزم قصور المجموعة بالنسبة للمحور (Δ) هو J_{Δ} .
 - خيط (f) غير مدود كتلته مهملة ملفوف حول مجرى البكرة و ثبت احد طرفيه بجسم صلب (S_1)، كتلته $m = 0,8 \text{ kg}$ و مركز قصوره G_1 . الجسم (S_1) قابل للانزلاق على مستوى مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للمستوى الأفقي وفق الخط الأكبر ميلا.
- نعتبر أن الخيط (f) لا ينزلق على مجرى البكرة أثناء الحركة. نحرر المجموعة بدون سرعة بدئية عند اللحظة $t = 0$ حيث يكون G_1 متطبقا مع الأصل O للمعلم ($O, \vec{i}$). نعلم عند كل لحظة موضع G_1 بالافصول x .



الشكل - 1

1 - أوجد ، اعتمادا على الدراسة التحريكية ، تعبير التسارع a لحركة الجسم (S_1) بدلالة : m ، J_Δ ، r ، g و α .

2 - يمثل منحني الشكل - 2 تغيرات مربع السرعة للجسم (S) بدلالة x : $V^2 = f(x)$.

1 - 2 - حدد قيمة a و استنتج قيمة التسارع الزاوي $\dot{\theta}$ للمجموعة " الساق + البكرة "

2 - 2 - انفصل الجسم (S_1) عن الخيط لحظة مروره بالنقطة B ذات الإحداثيات $x_B = 0.8m$ فيسقط عند نقطة I على المستوى الأفقي (π) الذي يوجد على مسافة $h = 1m$ من النقطة B .

2 - 2 - 2 - أوجد إحداثيتي النقطة I في المعلم $(\overrightarrow{BX}, \overrightarrow{BY})$.

2 - 2 - 2 - احسب السرعة الخطية للطرف M للساق بعد انفصال الجسم (S_1) عن الخيط .

3 - نعيد ربط الخيط بالجسم (S_1) ونثبت بالساق في نقطة M' ، بحيث $MM' = \frac{L}{2}$ ، نابضا لفاته غير

متصلة و كتلته مهملة و صلابته $K = 50N.m^{-1}$ ، الطرف الثاني للنابض مثبت بحامل " الشكل - 3 " . يكون النابض عند التوازن أفقيا و مطاللا و الساق MN رأسية و أفصولها G_1 منطبقا مع الأصل O للمعلم $(O; \vec{k})$.

3 - 1 - أوجد ، عند التوازن ، تعبير إطالة النابض Δl بدلالة المقادير اللازمة .


3 - 2 - نزيع الجسم (S_1) عن موضع توازنه بمسافة $d = 1m$ نحو الأسفل وفق الخط الأكبر ميلا فتدور

المجموعة " الساق + البكرة " بزاوية صغيرة θ_0 و نحرره بدون سرعة بدئية عند اللحظة $t = 0$.

التصحيح

- 1

- المجموعة المدروسة : الجسم (S_1)
 - المعلم : مرتبط بالأرض و يعتبر غاليليا
 - جهد القوى : وزن الجسم $\vec{P}_1$ ، تأثير السطح $\vec{R}$ ، تأثير الخيط $\vec{T}(f)$.
 - تطبيق ع . أ . د : $\sum \vec{F}_{APP} = m_1 \cdot \vec{a}$ و منه : $\vec{P}_1 + \vec{R} + \vec{T} = m_1 \cdot \vec{a}$.
 - إسقاط ع . أ . د على المحور $(O; \vec{i})$ نحصل على : $m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha - T = m_1 \cdot a$
- و بالتالي : $T = m_1 \cdot g \cdot \sin \alpha - m_1 \cdot a$ (1)



حساب التسارع الزاوي للمجموعة : $\ddot{\theta} = \frac{a}{r} = \frac{2.5}{5 \cdot 10^{-2}} = 50 \text{ rad.s}^{-2}$

2-2-1 - إحداثيتي النقطة I :

• حساب السرعة V_B

بإستعمال العلاقة المستقلة عن الزمن بين الموضعين O و B ،

نجد سرعة الجسم (S_1) عند الموضع B :

$$V_B = \sqrt{2 \cdot a \cdot x_B} = 2 \text{ m.s}^{-1}$$

• المعادلتين الزميتين :

$$\begin{cases} x = V_B \cdot \cos(\alpha) t \\ y = \frac{1}{2} \cdot g t^2 + V_B \cdot \sin(\alpha) t \end{cases}$$

بعد إقصاء الزمن $t = \frac{x}{V_B \cdot \cos(\alpha)}$ نحصل على معادلة المسار

$$y = \frac{g}{2 V_B^2 \cdot \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha) x \quad \text{و منه} \quad y_I = h = \frac{g}{2 V_B^2 \cdot \cos^2(\alpha)} x_I^2 + \tan(\alpha) x_I$$

• المجموعة المدروسة : البكرة

• المعلم : مرتبط بالأرض و يعتبر غاليليا

• جرد القوى : وزن البكرة $\vec{P}'$ ، تأثير محور الدوران $\vec{R}'$ ، تأثير الخيط $\vec{T}'$ (f)

• تطبيق ع . أ . د : $\sum M_{\Delta}(\vec{F}_{app}) = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$ و منه :

$$M_{\Delta}(\vec{P}') = M_{\Delta}(\vec{R}') = 0 \quad \text{مع} \quad M_{\Delta}(\vec{P}') + M_{\Delta}(\vec{R}') + M_{\Delta}(\vec{T}') = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$$

و بالتالي نحصل على المعادلة التالية : $T' \cdot r = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$ (2)

بما أن الخيط غير مدود و كتلته مهملة فإن : $T' = T$ و من جهة أخرى لا ينزلق على مجرى البكرة فإن :

$$a = g \cdot \frac{m \cdot \sin \alpha}{m + \frac{J_{\Delta}}{r^2}} \quad \text{و منه} \quad \ddot{\theta} = \frac{a}{r} \quad \text{و} \quad \theta = \frac{x}{r}$$

2-1-2 - دالة خطية معادلتها : $V^2 = Kx$ مع K يمثل المعامل الموجه للمنحنى ، نحصل بإشتقاق

$$2V \cdot \frac{dV}{dt} = K \cdot V \quad \text{و منه} \quad a = \frac{K}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta(V^2)}{\Delta(x)} = 2.5 \text{ m.s}^{-2}$$

نحصل على معادلة من الدرجة الثانية : $\frac{g}{2.V_B^2 \cdot \cos^2(\alpha)} . x_I^2 + \tan(\alpha) . x_I - h = 0$ التي يمكن كتابتها على


الشكل التالي : $1.66 . x_I + 0.577 . x_I - 1 = 0$ و أحد حلولها $x_I = 0.62m$

$$\left. \begin{array}{l} x_I = 0.62m \\ y_I = 1m \end{array} \right\} \text{إحداثيتي النقطة } I$$

2-2-2 السرعة الخطية للطرف M بعد انفصال الجسم :

$$\dot{\theta}_B = \dot{\theta}_M \text{ و التعويض نجد : } \frac{V_B}{r} = \frac{V_M}{L}$$

$$\text{و بالتالي : } V_M = V_B \frac{L}{r} = 8m.s^{-1}$$



1-3 دراسة التوازن :

• الجسم (S_1) : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ و منه : $T_1 = m_1 . g . \sin(\alpha)$

• البكرة : $\sum M_\Delta = 0$ و منه $T . \frac{L}{2} = T_1' . r$ حيث $T = K . \Delta l$ و $T_1' = T_1$

$$\Delta l = 2 . \frac{m . g . r . \sin(\alpha)}{K . L} \text{ : إطالة النابض عند التوازن من خلال العلاقتين السابقتين}$$

3-2-1 الدراسة الطاقية للمجموعة " (S) "

$$\bullet \text{ الطاقة الحركية : } E_c = \frac{1}{2} . m . V^2 + \frac{1}{2} . J_\Delta . \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} . m . V^2 + \frac{1}{2} . J_\Delta . \frac{V^2}{r^2} = \left(\frac{J_\Delta}{r^2} + m \right) \frac{V^2}{2}$$

• طاقة الوضع المرنة : $E_{Pe} = \frac{1}{2} . K (\Delta l + d)^2 + C^{re}$ مع الثابتة $C^{re} = 0$ حسب مرجع طاقة الوضع

المرنة وكذلك : $d = \frac{L}{2} \cdot \theta$ و بالتالي :

$$E_{Pe} = \frac{1}{2} \cdot K \left(\Delta l + \frac{L}{2} \cdot \theta \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta l^2 + \frac{1}{2} \cdot K \cdot \frac{L^2 \cdot \theta^2}{4} + \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta l \cdot \theta$$

• طاقة الوضع الثقالية : $E_{pp} = -m \cdot g \cdot z + C^{te} = 0$ مع الثابتة C^{te} و بالتالي : $E_{pp} = -m \cdot g \cdot z$

بما ان جميع الاحتكاكات مهملة فان الطاقة الميكانيكية تتحفظ و بالتالي : $\frac{dE_m}{dt} = 0$ و منه نحصل بالاشتقاق على :

$$\frac{dE_c}{dt} = \left(\frac{J_{\Delta}}{r^2} + m \right) V \cdot \dot{V} = \left(\frac{J_{\Delta}}{r^2} + m \right) \dot{x} \cdot \dot{x} = \left(\frac{J_{\Delta}}{r^2} + m \right) \frac{\dot{z}}{\sin(\alpha)} \cdot \frac{\ddot{z}}{\sin(\alpha)}$$

$$\frac{dE_{Pe}}{dt} = K \cdot L^2 \frac{\theta \cdot \dot{\theta}}{4} + \frac{K \cdot \Delta l \cdot L \cdot \dot{\theta}}{2} = K \cdot \frac{L^2}{4} \cdot \frac{x}{r} \cdot \frac{\dot{x}}{r} + \frac{K \cdot \Delta l \cdot L \cdot \dot{x}}{r}$$

$$\frac{dE_{Pe}}{dt} = K \cdot \frac{L^2}{4} \cdot \frac{z}{r \cdot \sin(\alpha)} \cdot \frac{\dot{z}}{r \cdot \sin(\alpha)} + \frac{K \cdot \Delta l \cdot L \cdot \dot{z}}{2 \cdot r \cdot \sin(\alpha)}$$

$$z = x \sin \alpha$$

$$\frac{dE_{pp}}{dt} = -m \cdot g \cdot \dot{z}$$

و بالتعويض :

$$\frac{dE_m}{dt} = \left(\frac{J_{\Delta}}{r^2} + m \right) \frac{\dot{z} \cdot \ddot{z}}{\sin^2(\alpha)} + \frac{K \cdot L^2 \cdot z \cdot \dot{z}}{4 \cdot r^2 \cdot \sin^2(\alpha)} + \frac{K \cdot L \cdot \Delta l \cdot \dot{z}}{2 \cdot r \cdot \sin(\alpha)} - m \cdot g \cdot \dot{z} = 0$$

من خلال العلاقة المحصل عليها في الدراسة السكونية : $m \cdot g = \frac{K \cdot L \cdot \Delta l}{2 \cdot r \cdot \sin(\alpha)}$ و بالتالي :

$$\frac{dE_m}{dt} = \left(\frac{J_{\Delta}}{r^2} + m \right) \frac{\dot{z} \cdot \ddot{z}}{\sin^2(\alpha)} + \frac{K \cdot L^2 \cdot z \cdot \dot{z}}{4 \cdot r^2 \cdot \sin^2(\alpha)} = 0$$

و بالتالي : $\left(\frac{J_{\Delta}}{r^2} + m \right) \ddot{z} + \frac{K \cdot L^2 \cdot z}{4 \cdot r^2} = 0$ و منه نحصل على المعادلة التفاضلية : $\ddot{z} + \frac{K \cdot L^2}{4(J_{\Delta} + m \cdot r^2)} \cdot z = 0$

معادلة تفاضلية خطية من الدرجة الثانية معاملها $\omega_0^2 = \frac{K \cdot L}{4(J_{\Delta} + m \cdot r^2)}$ ثابت و موجب و حلها جيبى .

3 - 2 - 2 - المعادلة الزمنية لحركة الجسم : $z = z_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$ حيث : $\omega_0 = \frac{2 \cdot \pi}{0.5} = 4 \cdot \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ و

$\varphi = 0$ لان عند $t = 0$ $z = z_m = d \cdot \sin(\alpha)$ و بالتالي : $z = 5 \cdot 10^{-2} \cdot \cos(4 \cdot \pi \cdot t)$

تصحيح الموضوع الأول : عبد الكريم سبيرو

الموضوع الثاني : عبد العلي رضوان

Sbiro abdelkrim