


تمرين 1 :




خلال بطولة ألعاب القوى ، قذف أحد الأبطال كرة حديدية (نعتبرها نقطية) كتلتها $m = 7,35 \text{ kg}$ وعلى ارتفاع $h = 1,8 \text{ m}$ من سطح الأرض بسرعة بدئية $\vec{V}_0$ تكون زاوية $\alpha = 45^\circ$ مع المستوى الأفقي فقطعت المسافة $x_1 = 19,43 \text{ m}$ من O (أنظر الشكل جانبه)
نعطي :

* شدة مجال الثقالة : $g = 10 \text{ m.s}^{-1}$

- 1 - أوجد معادلة المسار بدلالة h و α و g و V_0 .
- 2 - أوجد تعبير السرعة البدئية V_0 بدلالة h و α و g و x_1 . أحسب V_0 .
- 3 - أوجد الارتفاع H الذي تصل إليه الكرة .
- 4 - حدد إحداثيات متجهة السرعة $\vec{V}_S$ عند الارتفاع H .
- 5 - حدد منظم متجهة السرعة $\vec{V}_C$ عند النقطة C (نقطة سقوط الكرة) .
- 6 - أوجد قيمة الزاوية β التي يكونها اتجاه متجهة السرعة $\vec{V}_C$ عند النقطة C مع اتجاه المحور (Ox) .

تمرين 2 :



في مقابلة لكرة القدم ، خرجت الكرة إلى التماس ، ولإعادتها إلى الميدان ، يقوم أحد اللاعبين برميها من خط التماس بكلتا يديه لتميرها فوق رأسه .
لدراسة حركة الكرة ، نهمل تأثير الهواء وننمذج الكرة بنقطة مادية ونأخذ $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.
في اللحظة $(t = 0)$ تغادر الكرة يدي اللاعب في نقطة A توجد على ارتفاع $h_0 = 2 \text{ m}$ من سطح الأرض بسرعة بدئية $\vec{V}_0$ يكون اتجاهها زاوية $\alpha = 25^\circ$ مع المستوى الأفقي (أنظر الشكل - 3) .

نعتبر لاعبا آخر من فريق الخصم طول قامته $h_1 = 1,80 \text{ m}$ ويقف على بعد $x_1 = 12 \text{ m}$ من اللاعب الذي يرمي الكرة .

- 1 - بين أن معادلة المسار في المعلم (Oxz) هي : $z = \left(-\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (\tan \alpha)x + h_0$
- 2 - يقفز اللاعب الخصم بمسافة $h' = 70 \text{ cm}$ نحو الأعلى ولم ينجح في التصدي للكرة فترتطم هذه الأخيرة بالأرض عند نقطة P أفصولها $x_p = 18 \text{ m}$ ، استنتج قيمة السرعة البدئية V_0 .
- 3 - على أي ارتفاع h_2 من رأس الخصم تمر الكرة ؟
- 4 - بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية ، أوجد قيمة السرعة V_p التي تصل بها الكرة إلى النقطة P .
- 5 - أحسب المدة الزمنية t_p المستغرقة من طرف الكرة منذ لحظة انطلاقها إلى غاية ارتطامها بالأرض .

تمرين 1 :

التنقيط	عناصر الإجابة
2	1 - معادلة المسار : بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ، نجد : $\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$ ، أي : $\begin{cases} V_x = V_0 \cdot \cos \alpha \\ V_y = -gt + V_0 \cdot \sin \alpha \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} x = (V_0 \cos \alpha) \cdot t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_0 \sin \alpha)t + h \end{cases}$ نستنتج أن : $y = -\frac{g}{2V_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \alpha) \cdot x + h$
1,5	2 - تعبير السرعة البدئية وحسابها : $V_0 = \frac{x_1}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{g}{2((\tan \alpha) \cdot x_1 + h)}} = 13,2 \text{ m.s}^{-1}$
2	3 - الارتفاع الذي تصل إليه الكرة : عند قمة المسار (S) : يكون لدينا : $\left(\frac{dy}{dx}\right)_S = 0$ ، أي : $x_S = \frac{V_0^2 \sin(2\alpha)}{2g}$ ومنه : $H = y_S = \frac{V_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g} + h = 6,2 \text{ m}$
1,5	4 - إحداثيات متجهة السرعة عند الارتفاع H : $\begin{cases} V_x = V_0 \cdot \cos \alpha = 9,33 \text{ m.s}^{-1} \\ V_y = 0 \end{cases}$
1,5	5 - منظم متجهة السرعة عند النقطة C : بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية أو انحفاظ الطاقة الميكانيكية ، نجد : $V_C = \sqrt{V_0^2 + 2gh} = 14,5 \text{ m.s}^{-1}$
2	6 - قيمة الزاوية β : في النقطة C ، لدينا : $\cos \beta = \frac{V_0 \cos(\alpha)}{V_C} = 0,64$ وبالتالي : $\beta = 50^\circ$

تمرين 2 :

2	1 - معادلة المسار : * تطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{a} = \vec{g} \Leftrightarrow \sum \vec{F} = \vec{P} = m \vec{a}$ * إسقاط العلاقة على المحورين (Ox) و (Oz) : $\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = cte = V_0 \cos \alpha \\ \dot{z} = -gt + V_0 \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = (V_0 \cos \alpha) t \\ z = -\frac{1}{2} g t^2 + (V_0 \sin \alpha) t + h_0 \end{cases}$ * بإقصاء الزمن ، نجد معادلة المسار : $z = \left(-\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (\tan \alpha) x + h_0$
2	2 - عند النقطة P ، لدينا $x_p = 18 m$ و $z_p = 0$ إذن : $0 = -\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} x_p^2 + (\tan \alpha) x_p + h_0$ ، نستنتج أن : $V_0 = 13,7 m.s^{-1}$
2	3 - في النقطة ذات الأفصول ($x_1 = 12 m$ موضع اللاعب الخصم) تمر الكرة على ارتفاع z_1 من سطح الأرض ، حيث : $z_1 = \left(-\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x_1^2 + (\tan \alpha) x_1 + h_0$ ، أي : $z_1 \approx 3 m$ وبما أن طول قامته اللاعب الخصم هو $h_1 = 1,8 m$ ويقفز بمسافة $h' = 0,70 m$ ، فإن الكرة تمر على ارتفاع $h_2 = z_1 - (h_1 + h') = 3 - (1,8 + 0,7) = 0,5 m$ ، أي : من رأس الخصم ، أي : $h_2 = 3 - (1,8 + 0,7) = 0,5 m$
1,5	4 - تطبيق مبرهنة الطاقة الحركية : $\frac{1}{2} m V_p^2 - \frac{1}{2} m V_0^2 = W(\vec{P}) = -mg \Delta z = mgh_0$ $\Rightarrow V_p = \sqrt{V_0^2 + 2gh_0} = 15,09 m.s^{-1}$
2	5 - المدة الزمنية المستغرقة من طرف الكرة : $t_p = \frac{x_p}{V_0 \cos \alpha} = 1,45 s$