

تترك جسما s كتلته $m = 500g$ في النقطة A لينزلق على سكة $ABCD$ (أنظر الشكل) بدون سرعة بدئية. يكتسب الجسم طاقة حركية في النقطة B قدرها $E_{cB} = 1J$.
 $\alpha = 30^\circ$; $h = AA' = 1m$.

1- بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية احسب شغل قوى الاحتكاك ثم استنتج قيمة قوة الاحتكاك بين السكة والجسم على الجزء AB . (0.75 ن).

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن اكتب عبارة التسارع ثم احسب قيمته العددية على الجزء AB . (0.75 ن).

3- اكتب المعادلة الزمنية لحركة الجسم s من A إلى B باعتبار A أصلا للأفاصيل ولحظة تسجيلها أصلا للتواريخ. (0.5 ن).

4- جواصل الجسم حركته في باقي المسار بدون احتكاك و يصل إلى النقطة D بسرعة $V_D = 1/2 V_B$.
 $OC = OD = 2m$; $g = 10 ms^{-2}$

1-4- بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية أوجد قيمة الزاوية $\beta = (COD)$. (0.75 ن)

2-4- أوجد شدة تأثير السكة CD على الجسم عند الموضع D . (1 ن)

5- جافاد الجسم والسكة في اللحظة $t = 0$ عند D ليبقى تحت تأثير وزنه فقط.

1-5- أوجد معادلة المسار $y(x)$ لحركة الجسم في المعلم (D, x, y) . (0.75 ن)

2-5- احسب إحداثيات قمة المسار H . (0.75 ن)

3-5- احسب لحظة وسرعة اصطدام الجسم بالمحور DX . (1 ن)

التمرين الثاني 6,5 ن

يتكون نواس اللي من سلك فولادي رأسي ثابتة ليه C مثبت من طرفه الأعلى في حامل ، ويحمل في طرفه الأسفل قضيبا متجانسا AB ، طوله $\ell = 2cm$ ، عزم قصوره بالنسبة لمحور رأسي هو $J_A = 4.10^{-4} kg.m^2$.

ندبر القضيب AB أفقيا حول المحور (Δ) في المنحني الموجب بالزاوية θ_m انطلاقا من موضع توازنه ، ثم نحرره بدون سرعة بدئية في اللحظة ذات التاريخ $t = 0$.

نمعلم موضع القضيب في كل لحظة بأفصوله الزاوي θ ، الذي نقيسه بالنسبة لموضع التوازن . نهمل جميع الاحتكاكات ونأخذ $\pi^2 = 10$.

1 - بتطبيق العلاقة الأساسية للحريك ، أوجد المعادلة التفاضلية لحركة

القضيب ، واستنتج تعبير الدور الخاص T_0 بدلالة J_A و C . (1 ن)

2 - باختيار موضع التوازن القضيب مرجعا لطاقة الوضع للي ، أوجد تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة { حامل ، سلك ، قضيب } بدلالة J_A و C

والأفصول الزاوي θ والسرعة الزاوية $\dot{\theta}$. (1 ن)

3 - يمثل المبيان أسفله مخطط الطاقة الميكانيكية وطاقة وضع اللي للمجموعة .

باعتمادك على هذا المبيان أوجد :

3 - 1 القيمة القصوى لطاقة الوضع للي .

3 - 2 الوسع θ_m (0.75 ن)

3 - 3 ثابتة اللي للسلك C . (1 ن)

4 - أعط المعادلة الزمنية لحركة القضيب . (0.75 ن)

5 - ثبت على القضيب وعلى نفس المسافة $d = \ell/4$ من


المحور (Δ) سحمتين مماثلتين كتلتيهما $m_1 = m_2 = m$. ونزج

القضيب عن موضع توازنه بنفس الزاوية θ_m ونحرره بدون سرعة بدئية .

أحسب الكتلة m ، علما أن المتذبذب ينجز 10 ذبذبات خلال مدو $\Delta t = 15s$.

نعطي $J'_A = J_A + 2md^2$ عزم قصور المجموعة { القضيب ، السحمتين } بالنسبة للمحور Δ . (2 ن)

الكيمياء 7 ن



$acide + alcool \rightarrow ester + eau$				معادلة التفاعل	
كميات المادة				التقدم	الحالة
0,20	0,20	0	0	0	البدئية
				x	خلال التفاعل
				x_{eq}	عند التوازن

4 تعطي التجربة التقدم عند التوازن للإستر - $x_{eq} = 0,13mol$

- 5 - 1 أعط الصيغة نصف المنشورة للإستر الناتج وحدد صنف الكحول المستعمل
5 - 2 علما أن مردود هذا التحول الجديد هو 60% ، أحسب القيمة الجديدة للتقدم عند التوازن
5 - 3 استنتج قيمة ثابتة التوازن باستعمال هذ الكحول الجديد

msn: sbiabdou@hotmail.fr
mail :sbiabdou@yahoo.fr

بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية عليه بين A و B :

2

$$f = \frac{-W\vec{R}}{AB} = \frac{-(-4J)}{2} = 2N \quad \text{ومنه ، شدة قوة الاحتكاك:}$$


2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم S بين A و B .

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{R} + \vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{R} \begin{cases} R_x = -f \\ R_y = +R_N \end{cases}$$

$$\vec{P} \begin{cases} P_x = +P \cdot \sin \alpha \\ P_y = -P \cdot \cos \alpha \end{cases}$$



بالإسقاط على المحور ox :

تسارع الجسم $a_x = a$ لأن الحركة تتم وفق المحور ox (أي $a_y = 0$).

$$a = g \sin \alpha - \frac{f}{m} = 10 \cdot (0,5) - \frac{2}{0,5} = 5 - 4 = 1 \text{ m/s}^2 \quad \text{ومنه:}$$

3- باعتبار A أصلا للأفاصل ولحظة تسجيلها أصلا للتواريخ .

$$x = \frac{1}{2} a t^2 = 0,5 t^2 \quad \text{المعادلة الزمنية للحركة :}$$

4-4-1

$$v_B = \sqrt{\frac{2 \cdot E_{cB}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot (1)}{0,5}} = \sqrt{4} = 2 \text{ m/s} \quad \Leftarrow \quad E_{cB} = \frac{1}{2} m \cdot v_B^2$$

$$v_D = \frac{v_B}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ m/s}$$


بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية عليه بين B و C :

$$\Delta E_{C \rightarrow D} = \Sigma W \vec{F}_{C \rightarrow D}$$

$$z_C = 0$$

$$z_D = r - OH = r - r \cos \beta = r(1 - \cos \beta)$$

$$OC = r$$



$$\Delta E_{C \rightarrow D} = W \vec{P}_{C \rightarrow D} + W \vec{R}_{C \rightarrow D}$$

$$W \vec{R}_{C \rightarrow D} = 0$$

$$E_{cD} - E_{cC} = W \vec{P}_{C \rightarrow D} + 0$$

$$E_{cD} - E_{cC} = mg(z_C - z_D)$$

$$E_{cD} - E_{cC} = mg[0 - r(1 - \cos \beta)]$$

$$E_{cD} - E_{cC} = -mgr(1 - \cos \beta)$$

$$Ec_D - Ec_C = -mgr + mgr \cos \beta$$

$$Ec_D - Ec_C + mgr = mgr \cos \beta$$

$$\cos \beta = \frac{Ec_D - Ec_C}{mgr} + 1$$

$$Ec_C = 1J \quad \text{و} \quad Ec_D = \frac{1}{2} m.v_D^2 + 0,5.(0,5).1^2 = 0,25J \quad \text{لدينا :}$$

$$\beta = 22,3^\circ \Leftarrow \cos \beta = \frac{Ec_D - Ec_C}{mgr} + 1 = \frac{0,25 - 1}{0,5.(10).2} + 1 = 0,925$$

-2-4


بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم S بين C و D.

$$\Sigma \vec{F} = m.\vec{a}_G$$

$$\vec{R} + \vec{P} = m.\vec{a}_G$$

باعتبار معلم فريني (O, $\vec{u}$, $\vec{n}$) في النقطة D وبإسقاط العلاقة السابقة على المنظمي تصبح :

$$-P \cos \beta + R = m.a_n$$



$$\vec{a} \left| \begin{array}{l} a_t = \frac{dv}{dt} \\ a_n = \frac{v^2}{r} \end{array} \right.$$

نعلم أن متجهة التسارع في معلم فريني لها مركبتين :


$$-mg \cos \beta + R = m.\frac{v_D^2}{r}$$

العلاقة السابقة تصبح :

$$R = m.\frac{v_D^2}{r} + mg \cos \beta = \frac{0,5.(1)^2}{2} + 0,5.(10).0,925 = 0,25 + 4,625 = 4,875N \quad \text{ومنه :}$$

$$\begin{cases} v_{Dx} = v_D \cdot \cos \beta \\ v_{Dy} = v_D \cdot \sin \beta \end{cases}$$

5- 1-5 $\vec{v}_D$ تكون زاوية β مع المحور الأفقي . ولها مركبتين في المعلم (o, x, y)



بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم S بعد مغادرته للسكة.

$$\vec{P} = m.\vec{a}_G$$

بالإسقاط على المحور ox $0 = m.a_x$ الحركة حسب المحور ox مستقيمة منتظمة تتم بسرعة ثابتة $v_x = v_D \cdot \cos \beta$

$$(1) \quad x = (v_D \cdot \cos \beta).t$$

معادلتها الزمنية :

بالإسقاط على المحور oy $-P = m.a_y$ الحركة حسب المحور oy مستقيمة متغيرة بانتظام ، دالة السرعة حسب oy

$$.v_y = -g.t + v_D \sin \beta$$

ومعادلتها الزمنية : $(2) \quad y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_D \cdot \sin \beta)t$

ونحصل على معادلة المسار بإزالة المتغيرة t بين x و y : من خلال (1) $t = \frac{x}{v_D \cdot \cos \beta}$

بالتعويض في y : $y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_D^2 \cos^2 \beta} + xt \tan \beta$

-2-5

عند القمة S لدينا : $v_y = 0$ أي : $-gt + v_D \sin \beta = 0 \Leftrightarrow t = \frac{v_D \sin \beta}{g}$

بالتعويض في (1) نحصل على : $x_S = \frac{v_D^2 \cos^2 \beta}{g}$

وبالتعويض في (2) $y_S = -\frac{v_D^2 \sin^2 \beta}{2g} + \frac{v_D^2 \sin^2 \beta}{g} = \frac{v_D^2 \sin^2 \beta}{g}$

-3-5 عند الإصطدام بالمحور Dx : $y = 0$

$-\frac{1}{2}gt + (v_D \cdot \sin \beta) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt^2 + (v_D \cdot \sin \beta)t = 0 \quad y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_D \cdot \sin \beta)t$

المدة المستغرقة من طرف القذيفة للوصول على نقطة الاصطدام مع المحور Dx : $t = \frac{2v_D \cdot \sin \beta}{g} = \frac{2 \cdot (1) \cdot \sin 22,33}{10} \approx 0,076s = 76ms$

.....


التمرين الثاني للفيزياء :

-1

المجموعة المدروسة {القضيب}

جرد القوى : القضيب خلال الحركة يخضع للقوى التالية :

- $\vec{P}$: وزنه.
- $\vec{R}$: تأثير السلك.
- قوى اللي ذات العزم : $M_t = -C \cdot \theta$



تطبيق العلاقة الأساسية للتحريك على القضيب : $\Sigma M_{\Delta} \vec{F} = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$

أي : $M_{\Delta} \vec{P} + M_{\Delta} \vec{R} + M_t = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$

$M_{\Delta} \vec{P} = 0$ و $M_{\Delta} \vec{R} = 0$ لأن خطي تأثيرهما يتقاطعان مع محور الدوران.

إذن : $0 + 0 - C \cdot \theta = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$

أي : $J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta} + C \theta = 0$ ومنه : $\ddot{\theta} + \frac{C}{J_{\Delta}} \theta = 0$ المعادلة التفاضلية للحركة التذبذبية لنواس اللي.

حل هذه المعادلة دالة جيبية تكتب كما يلي : $\theta(t) = \theta_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$


نبضها الخاص : $\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J_{\Delta}}}$ ب : rad/s و دوره الخاص (1) $T_O = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{J_{\Delta}}{C}}$

2- باعتبار كحالة مرجعية موضع التوازن ، يكون تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة كما يلي :

$$E_m = E_C + E_p$$

$$= \frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C \theta^2$$

3-3-1 من حلال المخطط : $E_m = 3.10^{-3} J$



-2-3 $\theta_m = \frac{\pi}{4}$

-3-3 لدينا :

$$C = \frac{2.E_m}{\theta_m^2} = \frac{2.(3.10^{-3})}{(\frac{\pi}{4})^2} = \frac{16.(2).3.10^{-3}}{10} = 9,6.10^{-3} N.m/rad \quad \Leftrightarrow \quad E_m = \frac{1}{2} C \theta_m^2$$

4- المعادلة الزمنية لحركة القضيب :

$$\theta = \theta_m \cdot \cos(\omega_o . t + \varphi)$$

و : $\theta_m = \frac{\pi}{4}$ $\omega_o = \sqrt{\frac{C}{J_{\Delta}}} = \sqrt{\frac{9,6.10^{-3}}{4.10^{-4}}} = 4,9 rad$ ومن خلال الشرط البدئية :

ندير القضيب AB أفقيا حول المحور (Δ) في المنحنى الموجب بالزاوية θ_m انطلاقا من موضع توازنه ، ثم نحرره بدون سرعة بدئية في اللحظة ذات التاريخ $t = 0$.


$$\theta_m = \theta_m \cdot \cos(0 + \varphi) \quad \Leftrightarrow \quad \cos \varphi = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = 0$$

المعادلة الزمنية لحركة القضيب :

$$\theta = \frac{\pi}{4} \cdot \cos(4,9.t)$$

-5

إذا كان القضيب يحمل سحمتين مماثلتين لهما نفس الكتلة .



عزم قصوره : $J'_\Delta = J_\Delta + 2md^2$ مع : J_Δ (2) : عزم القضيب ودوره الخاص :

$$T_o = 2\pi \sqrt{\frac{J_\Delta + 2md^2}{C}}$$


$$T_o = 1,5s \Leftrightarrow 10T_o = 15s$$

$$\frac{C.T_o^2}{4\pi^2} - J_\Delta = 2md^2 \Leftrightarrow \frac{T_o^2}{4\pi^2} - \frac{J_\Delta}{C} = \frac{2md^2}{C} \Leftrightarrow \frac{T_o^2}{4\pi^2} = \frac{J_\Delta + 2md^2}{C}$$

$$m = \frac{C.T_o^2}{8d^2\pi^2} - \frac{J_\Delta}{2d^2} = 2md^2 = \frac{9,6 \cdot 10^{-3} \cdot (1,5)^2}{8 \cdot (0,5 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 10} - \frac{4 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot (0,5 \cdot 10^{-2})^2} = 10,8 - 8 = 2,8kg$$

تمرين الكيمياء:

-1



-2

acide	+	alcool	→	ester	+	eau	معادلة التفاعل
كميات المادة							الحالة
0,20		0,20		0		0	التقدم
0,20-x		0,20-x		x		x	البدينية
0,20-x _{eq}		0,20-x _{eq}		x _{eq}		x _{eq}	خلال التفاعل
							عند التوازن

$$x_{\max} = 0,20mol \quad -3$$

$$x_{eq} = 0,13 \quad -1-4 \quad -4$$

acide	+	alcool	→	ester	+	eau	معادلة التفاعل
كميات المادة							الحالة
0,20		0,20		0		0	التقدم
0,20-x		0,20-x		x		x	البدينية
0,07		0,07		0,13		0,13	خلال التفاعل
							عند التوازن

المردود: -2-4

$$r = \frac{x_{\exp}}{x_{\max}} = \frac{0,13}{0,20} = 0,65 = 65\%$$

-3-4 بما ان الكحول المستعمل اولي فإن مردود هذا التفاعل : $r = 67\%$ وبالتالي التفاعل لا زال لم يصل على حده . أي لا زال في حالة تطور

-5

1-5 - الصيغة النصف منشورة للإستر الناتج .

-2-5

$$x_f = r \cdot x_{\max} = 0,60 \cdot (0,20) = 0,12 \text{ mol} \Leftarrow r = \frac{x_f}{x_{\max}} = 60\% = 0,60$$

-3-5

تركيب الخليط عند التوازن : $x_{\max} = 0,20 \text{ mol}$ و $x_f = 0,12 \text{ mol}$

<i>acide</i>	+	<i>alcool</i>	$\rightarrow$	<i>ester</i>	+	<i>eau</i>	معادلة التفاعل	
كميات المادة							التقدم	الحالة
0,20		0,20		0		0	0	البدئية
0,20-x		0,20-x		x		x	x	خلال التفاعل
0,08		0,08		0,12		0,12	0,12	عند التوازن

$$k = \frac{[ester] [eau]}{[acide] [alcool]} = \frac{\frac{0,12}{V_s} \cdot \frac{0,12}{V_s}}{\frac{0,08}{V_s} \cdot \frac{0,08}{V_s}} = 2,25$$

SBIRO Abdelkrim